

1. Исследование проходимости маточных труб выполняется на аппарате УЗИ. Сопровождается введением в полость матки физиологического раствора натрия хлорида.
2. Исследование проводится только после предварительной консультации врача акушера-гинеколога и проведения обзорного УЗИ органов малого таза.
3. Исследование проводится в первую фазу менструального цикла, обычно с 7 по 11 день цикла, но дата может быть изменена лечащим врачом, исходя из индивидуальных особенностей пациента.
4. В цикле до и после проведения исследования необходима строгая контрацепция барьерными методами или половой покой.
5. Перед проведением исследования необходимо сдать мазок на степень чистоты влагалища, соскоб ПЦР на половые инфекции (хламидия трахоматис, трихомонада вагиналис, уреоплазма уреалитикум, гонококк, микоплазма гениталис, кандида альбиканс). Эти анализы действительны 14 дней с момента сдачи.
6. Также необходимо сдать кровь на вирусные гепатиты В и С, ВИЧ. Результаты действительны в течении 3х месяцев.
7. в течение 2-3 дней нужно соблюдать диету, которая исключает употребление продуктов, способствующих повышенному газообразованию (фруктов и свежих овощей, черного хлеба, газированных напитков, молока)
8. Опорожнить кишечник накануне (при склонности к запорам пациентке могут назначить специальные препараты или клизму)
9. За 1 час до исследования принять препарат, предотвращающий спазмирование
10. Принять душ.

После исследования:

1. После обследования не требуется постоянное наблюдение медицинского персонала. Пациентка может сразу же вернуться к обычной жизни.
2. Возможны появления болевых ощущений или дискомфорта внизу живота. Эти симптомы устраняются с помощью лекарственных препаратов, которые рекомендованы гинекологом.
3. В течении нескольких дней необходимо соблюдать половой покой, исключить купание в бассейне или открытом водоеме, исключить посещение сауны или бани.